

DESCRIPTIONS

DE

Coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique

4^e Partie (1).

Par M. LÉON FAIRMAIRE.

(Séance du 24 Mars 1880.)

103. LEISTUS AMPLICOLLIS Fairm., Naturaliste, 1880, 190. — Long. 10 1/2 mill. — *Oblongus, parum convexus, atro-cyanus, nitidus, antennis ferrugineis, articulis 3 primis fuscis, apice anguste ferrugineis, tarsiis piccis, ore palpisque luteo-piccis; capite fere lævi, inter oculos puncto medio impresso, antice spatio leviter elevato signato et utrinque impresso; prothorace valde transverso, longitudine duplo latiore, lateribus fere angulatim rotundato-ampliatis, basi tantum breviter rectis, angulis posticis acutis, dorso transversim convexo, medio sat fortiter sulcato et fere bilobo, basi sat fortiter transversim depresso et punctato, margine antico depresso et punctato, lateribus reflexis, punctatis; clytris amplis, fere ovatis, ad humeris rotundatis, profunde striatis, striis sat tenuiter punctatis, post medium fere lævibus, intervallis convexiusculis; meso- et metasterni abdominisque segmentis 2 primis lateribus grosse punctatis, prosterno antice medio et basi punctato.*

Maroc.

Se rapproche du *crenatus* par la forme du corselet, qui est pourtant

(1) Voir Annales 1879, 1^{re} partie, page 155; 2^e partie, p. 245. — Ann. 1880, 3^e partie, p. 5.

plus court et plus dilaté latéralement et moins nettement bilobé sur le disque ; les élytres sont aussi moins courtes, avec les stries bien plus finement ponctuées, non crénelées, et les bords un peu moins relevés.

104. CARABUS FAVIERI, var. : PIRATICUS. — Forme générale et coloration du *C. Favieri*, même taille, mais avec le corselet plus large ainsi que les élytres dont le rebord est un peu plus large, formant mieux une gouttière. Leur sculpture est très-différente ; on reconnaît, sur chaque élytre, les trois séries moniliformes, mais la ligne intermédiaire est complètement brisée et remplacée par des tubercules ovalaires, un peu plus saillants et même un peu pointus en arrière ; le corselet est un peu plus large, mieux arrondi sur les côtés, et le troisième article des antennes présente une impression oblongue à la base.

C'est une variété locale et intéressante qui provient de Larache.

105. DROMIUS PRODERUS. — Long. 4 1/2 mill. — *Elongatus, testaceus, nitidus, capite obscuriore, prothorace rufo, elytris post medium plaga fusca communi, transversa, dentatu, marginem haud attingente, antice per suturam anguste prolongata, postice utrinque vage arcuatim retrorsum producta; capite ovato, inter antennas dense tenuiter strigoso, prothorace ovato, longitudine haud latiore, postice leviter angustato, lateribus antice leviter arcuatis, postice vix sinuatis, angulis posticis valde obtusis, dorso linea longitudinali impresso, basi transversim leviter depressa; elytris elongatis, angustis, postice paulo latioribus, striatis, striis interrupto-punctatis, prima basi breviter sulciformi, intervallis fere planatis, secundo ante medium puncto grosso impresso.*

Maroc.

Ce *Dromius* est remarquable par sa forme allongée qui le rapproche du *longiceps* ; mais il est plus petit, sa tête est moins oblongue, son corselet est moins large en avant, avec les côtés plus arrondis antérieurement, moins rebordés et le dos plus convexe, ses élytres sont plus fortement et plus complètement striées, la tache foncée est placée moins en arrière et est bien plus distincte.

106. ZABRUS DEFLEXICOLLIS. — Long. 10 mill. — *Ovato-oblongus, valde convexus, rufus (immaturus), nitidus; capite summo sat tenuiter dense*

punctato, inter oculos utrinque longitudinaliter sat fortiter impresso, stria transversali utrinque puncto magno terminata; antennis gracilibus, basi prothoracis haud longioribus; prothorace transverso, longitudine dimidio latiore, antice posticeque fere aequaliter angustato, lateribus antice valde rotundatis, postice magis rectis, angulis posticis obtusis, anticis fere rotundatis, dorso utrinque lævi, medio tenuiter ac breviter striato et tenuiter transversim strigosulo, antice punctulato, postice transverso et punctato, lateribus declivibus, anguste marginatis; elytris ovalis, basi truncatis, plica basali fere recta, lateribus vix arcuatis, striis profundis, regularibus, haud punctatis, intervallis planiusculis, lævibus; subtus haud punctatus.

Maroc.

L'unique individu de cette espèce est immature, mais ses caractères sont bien nets; elle se rapproche du *maroccanus* par son corselet à peine rebordé, mais la ponctuation est très-différente et les angles postérieurs ne sont pas arrondis; elle diffère du *puncticollis* Dej. par le corselet à côtés moins fortement arrondis, presque droits en arrière avec les angles postérieurs obtus, mais bien marqués; les stries des élytres sont plus profondes, le pli basilaire est bien moins arqué; tout le corps est un peu moins large et la tête est plus petite; la sculpture du corselet est presque la même, mais le disque est plus lisse de chaque côté de la strie médiane.

107. HYDROPORUS DORSOPLAGIATUS. — Long. 2 3/4 mill. — *Oblongus, modice convexus, postice leviter attenuatus, fuscus, capite, antennis prothoracisque margine laterali rufo-testaccis, elytris flavido-testaccis, macula magna transversa, medio sita, postice longe per suturam prolongata, marginem externum haud attingente, sed postice anguste producta infuscata, pedibus rufescentibus; capite convexiusculo, ad oculos impresso; prothorace brevi, antice leviter angustato, lateribus leviter arcuatis, utrinque striola laterali parallela signato, margine postice medio obtusissime angulato, antice lineola transversa leviter impresso; elytris oblongis, postice a medio attenuatis, apice obtuse acuminatis, lævigatis, utrinque lineis 2 leviter impressis et tenuiter punctulatis, apicem versus obsoletis; pectore utrinque tenuiter punctulato et vage infuscato,*

Algérie.

Voisin du *sexguttatus*, mais bien plus grand, plus allongé, un peu plus parallèle vers le milieu; les élytres ne sont pas distinctement ponctuées, leur coloration est différente, la grande tache dorsale n'est pas nettement arrêtée, ne se prolonge pas autant en avant et ne détermine pas de taches jaunes en arrière, leur surface longitudinale est aussi bien moins convexe.

108. HYDROPORUS CRIBRATELLUS. — Long. 3 mill. — *Oblongus, subparallelus, depressiusculus, nitidus, luteo-testaceus, elytris piceo-testaceis, margine luteo-testaceis; capite haud distincte punctato, valde biimpresso; prothorace basi, antice tantum angustato, lateribus a medio leviter arcuatis, margine postico medio obtusissime angulato, et utrinque obsolete sinuato, dorso haud sensim punctato, ante basin linea transversa leviter impresso; elytris oblongis, basi parallelis, ante apicem tantum attenuatis, apice acuminato, graciliter spinoso, dorso sat dense punctatis, utrinque linea fortius punctata signatis.*

Batna.

Ressemble, pour la coloration, à l'*II. obsoletus*, mais la forme subparallèle le rapproche du *productus*, dont il diffère notablement par la forme un peu plus courte, les élytres très-ponctuées et terminées chacune par une pointe aiguë. L'unique individu de cette espèce n'a peut-être pas toute sa coloration; il serait possible que les élytres fussent brunes avec le limbe clair.

109. HYDROPORUS PRODUCTUS. — Long. 3 1/4 mill. — *Elongatus, subparallelus, antice posticeque fere æqualiter angustatus, dorso planatus, fusco-niger, nitidus, ore, antennis pedibusque obscure testaceis; capite lato, parum convexo; prothorace brevi, antice angustato, lateribus leviter antice arcuatis, margine postico medio obtuse angulato, ante basin linea arcuatim transversa obsolete impresso, ad angulos posticos evidentius impresso; elytris elongatis ad apicem tantum angustatis, apice ipso obtuso, subtilissime vix perspicue sat dense punctulatis, utrinque lineis 2 fortius punctatis impressis.*

Batna.

Remarquable par sa forme allongée, presque parallèle, et sa punctua-

tion excessivement fine, à peine distincte, mais assez serrée. Sa forme rappelle assez celle des *H. notatus* et *neglectus*, mais elle est plus allongée, plus parallèle, plus acuminée en arrière et la partie dorsale est plus déprimée; la ponctuation est aussi toute différente et n'est visible qu'avec un fort grossissement, aussi le dessus est-il plus brillant. La coloration, d'un brun noir foncé, est un peu rougeâtre sur la tête, qui est très-finement et densément ponctuée, avec les deux impressions bien marquées.

110. *EULIPUS BRULLÆI* Woll. — L'insecte indiqué sous ce nom par M. Bates (Ent. month. Mag., 1875, 219) comme trouvé à Mogador par M. Trovev-Blackmore est l'*E. subelegans* Fairm., Ann. Soc. ent. Fr., 1870, p. 386 (*Tentyria*), qui se rapporte en effet au genre *Eulipus*, distinct des *Tentyria* par le labre saillant au devant de l'épistome. Cette dernière espèce ressemble extrêmement à l'*E. Brullæi*, mais elle en diffère par la forme du bord postérieur du corselet qui forme un angle un peu obtus au lieu d'être droit, par la ponctuation des élytres bien moins forte, par le pli supérieur des épipleures se prolongeant jusqu'à la base même au devant du pli qui remonte à l'écusson, et par les derniers articles des antennes un peu plus larges; le sillon transversal à la base de la tête, en dessous, est aussi plus profond.

111. *ASIDA FAVIERI* Fairm., Naturaliste, 1880, 190. — Long. 11 à 14 mill. — *Breviter ovato-subquadrata, crassa, modice convexa, fusca, opaca, tenuiter sat dense luteo-sericans, elytris ad suturam costula parum regulari, sæpius duplicata, brunneo-velutina; capite lævi, antice utrinque impresso; antennis sat gracilibus, medium prothoracis superantibus; prothorace transverso, lateribus explanato et valde rotundato, medio elytris latiore, antice profunde emarginato, angulis magnis, latis, sat productis, margine postico utrinque lute sinuato, angulis posticis latis, rectis, parum retro productis, dorso tenuissime asperulo, leviter inæquali, utrinque arcuatim late impresso, lateribus magis asperis; elytris quadratis, apice sat abrupte dectivibus et obtusis, carina externa acuta, dorso, prope suturam, utrinque costula duplici, interrupta, post medium abbreviata, fortiter et dense fusco-velutina, parte laterali leviter concava, subtus tenuissime dense asperula; ♀ major, lutior, elytris latioribus et magis convexis, magis ampliatis.*

Fez.

Cette curieuse *Asida* est remarquable par sa forme courte, son corselet fortement arrondi sur les côtés, plus large au milieu que les élytres; celles-ci sont ornées d'une ou deux bandes d'un velouté foncé, très-épaisses, irrégulières, interrompues. Elle se rapproche de l'*A. Kraatzi*, mais elle est plus courte, le corselet est bien plus ample, non ponctué, et ses angles postérieurs sont larges, en angle droit et non en forme de crochet.

412. *ASIDA ACUTICOSTA* Fairm., Naturaliste, 1880, 190. — Long. 13 à 15 mill. — *Ovata, crassa, dorso tantum depressa, nigra, parum nitida, subtus vix nitidior; capite dense punctato, arcuatim ac leviter impresso; antennis prothoracis medio paulo longioribus, articulo penultimo brevi, transverso, lateribus rotundato, antice vix sensim angustiore, dorso convexiusculo, lateribus explanato ac longitudinaliter impresso, dense fortiter oblongo-punctato, lateribus granatis, margine postico medio recto, utrinque leviter sinuato, angulis posticis magnis, recte acutis, modice productis; elytris ovalis, post medium ampliatis, sutura vix elevata, utrinque costa compressa, acuta, ante apicem oblitterata, intervallis, leviter concavis, tenuiter asperulis catus granatis et obsolete plicatulis; ♀ elytris magis amplis, postice magis dilatatis, intervallo externo magis plicato et costula longitudinali, irregulari aut interrupta signato; margine reflexo asperato; subtus dense punctata, pectore rugoso, abdomine strigoso.*

Ouazan.

Très-voisine de l'*A. Olcesii*, mais bien distincte par le corselet couvert de gros points oblongs, serrés, avec les côtés granulés et plus arrondis, et par les élytres, bien plus atténuées à la base, à côte très-saillante, tranchante, commençant dès la base, bien marquée aussi chez la femelle, avec les intervalles plus fortement granuleux; la réticulation de l'intervalle externe est assez remarquable.

413. *ASIDA TENUECOSTATA* Fairm., Naturaliste, 1880, 190. — Long. 12 à 13 mill. — *Oblonga, subparallèla, dorso paulo planata, nigro-fusca, tenuiter sat dense luteo-sericans; capite dense parum profunde punctato, subrugosulo, ante oculos lobato; antennis gracilibus, medium prothoracis superantibus articulo, penultimo latiore, cum ultimo rufo; prothorace subquadrato, antice leviter angustato, margine postico recto, angulis pos-*

licis latis, acutis, leviter retrorsis, margine antico sat fortiter emarginato, angulis anticis productis, margine laterali leviter arcuato, dorso dense sat tenuiter punctato, punctis ad marginem posticum majoribus, ad margines laterales majoribus et rugosis; scutello triangulari, punctulato; elytris oblongis, tenuiter densissime punctato-granulatis, sutura parum et anguste elevata, utrinque costis 3 angustis, elevatis, lævibus, duabus primis post medium conjunctis, externa basin haud attingente, margine externo aculo, margine reflexo parce ac tenuiter asperulo; subtus sat dense et sat tenuiter punctato-asperula; tibiis anticis extus haud denticulatis, apice extus in dente obtuso productis.

♂. *Angustior, prothorace paulo longiore, lateribus minus arcuatis, elytris subparallelis.*

♀. *Prothorace brevior, lateribus magis rotundato, antice magis angustato, elytris magis ovalis et magis convexis.*

Fez.

114. *CRYPTICUS PUNCTATOLINEATUS.* — Long. 6 mill. — *Oblongus, convexus, antice paulo latior, fusco-brunneus, sat nitidus, glaber, pedibus antennisque picco-rufescentibus; capite prothoraceque densissime tenuissime punctatis, hoc amplo, longitudine dimidio latiore, antice tantum leviter angustato et arcuato, postice elytris fere latiore, margine postico late sinuato, angulis fere obtusis, anticis rotundatis, limbo rufescenti-picco; scutello parvo, medio punctato; elytris post medium attenuatis, striato-punctatis, punctis sat grosse, striis parum impressis, intervallis lævibus, postice præsertim convexiusculis; subtus dense punctatus.*

Fez.

Ressemble un peu au *C. gibbulus*, mais bien plus étroit, plus convexe, plus atténué en arrière, avec le corselet plus ample, plus arrondi sur les côtés en avant, et les élytres à stries peu profondes, mais fortement ponctuées.

115. *PHYTÆCIA GOUGELETHI.* — Long. 10 à 12 mill. — *Elongata, postice leviter attenuata, supra planata, tota fusco-nigra, vix nitida, tenuiter grisco-pubescentis, corpore subtilis densius pubescente, subsericante;*

capite dense ac fere rugose punctato, medio leviter late impresso, lineola media longitudinali leviter elevata, antennis sericantibus, subtus parce hirtulis, prothorace quadrato lateribus fere rectis, obsolete undulatis, densissime sat tenuiter punctato, scutello fere truncato, tenuissime punctulato, elytris apice angustatis, ♂ truncatis, ♀ rotundatis, ab humeris leviter attenuatis, dense punctatis, extus longitudinaliter convexiusculis; subtus subtilissime dense punctulata.

♂. *Antennis corpore paulo longioribus, articulis 3-10 apice setosis, abdominis segmento ultimo late excavato.*

♀. *Antennis corpore brevioribus, abdominis segmento ultimo nitidior, convexo, minus dense ac grossius punctato, basi tenuiter sulcatulo.*

Maroc.

Cette *Phytæcia* est voisine des *P. flavipes* et *femoratis*; elle s'en distingue facilement par la coloration et par les articles des antennes munis à l'extrémité de soies spinuliformes.

